ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Α' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

19η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

«Επίκαιρα θέματα λοιμώξεων»



7 Νοεμβρίου 2026

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΕΜΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ

1837-2027 190 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Fluenz

Το μοναδικό παιδιατρικό, ρινικό εμβόλιο για την προφύλαξη έναντι της εποχικής γρίπης*

Fluenz®
ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα εμβόλιο γρίπης
(ζωντανού ιού, ρινικό)



Ο **αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με αντιγριπικό εμβόλιο**, το οποίο, όταν χορηγηθεί **σωστά και έγκαιρα**, προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού, συμβάλλει στην **προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές**, καθώς και στη μείωση των απουσιών από το σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση.[1]

*Τα στοιχεία είναι ακριβή τη στιγμή της δημιουργίας του υλικού.

Θεραπευτικές ενδείξεις[2]: Το Fluenz ενδείκνυται για την ενεργό ανοσοποίηση για την πρόληψη της γρίπης σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 2 ετών έως κάτω των 18 ετών. Το Fluenz πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας[2]: Τα δεδομένα ασφάλειας σχετικά με τη χρήση του Fluenz βασίζονται σε δεδομένα από κλινικές μελέτες του Fluenz σε περισσότερα από 29.000 παιδιά και εφήβους ηλικίας 2 έως 17 ετών, από μελέτες ασφάλειας του Fluenz μετά την έγκριση σε περισσότερα από 84.000 παιδιά και εφήβους ηλικίας 2 έως 17 ετών και σε δεδομένα από κλινικές μελέτες του τετραδύναμου εμβολίου γρίπης (ζωντανού εξασθενημένου ιού, ρινικό) σε περισσότερα από 2.000 παιδιά και εφήβους ηλικίας 2 έως 17 ετών. Πρόσθετη εμπειρία προέκυψε από τη χρήση μετά την κυκλοφορία του Fluenz ή/και του τετραδύναμου εμβολίου γρίπης (ζωντανού εξασθενημένου ιού, ρινικό). Σε κλινικές μελέτες, τα προφίλ ασφάλειας του Fluenz και του τετραδύναμου εμβολίου γρίπης (ζωντανού εξασθενημένου ιού, ρινικό) ήταν παρόμοια. Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια που παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες ήταν η ρινική συμφόρηση/ρινόρροια. Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών αναφέρθηκαν ως[2]: **Πολύ συχνές (≥1/10):** Μειωμένη όρεξη, Ρινική συμφόρηση/ρινόρροια, Αίσθημα κακουχίας. **Συχνές (≥1/100 έως <1/10):** Κεφαλαλγία, Μυαλγία, Πυρεξία. **Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100):** Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένων οιδήματος του προσώπου, κνίδωσης), Επίσταξη, Εξάνθημα. **Πολύ σπάνιες (<1/10.000):** Αναφυλακτικές αντιδράσεις. **Μη γνωστής συχνότητας (εμπειρία μετά την κυκλοφορία):** Σύνδρομο Guillain-Barré, Παρόξυνση των συμπτωμάτων του συνδρόμου Leigh syndrome (μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια), συγκοπή.

Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. **Λιανική Τιμή:** 27,70€

Βιβλιογραφία:

1. Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2025-2026 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός. https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi/ethniko-programma-emboliasmwn-epe-paidiwn-kai-efhbwn/14081-ethniko-programma-emboliasmwn-paidiwn-kai-efhbwn-2026-xronodiagramma-kai-systaseis. Accessed March 2026.
2. Fluenz. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Ιούλιος 2026

Για την ΠΧΠ, σκανάρετε το QR code.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

AstraZeneca

AstraZeneca AE,
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
T: 210 6871500
Αρ. Γ.ΕΜΗ. 00638901000
www.astrazeneca.gr

Flu/4525726/1/0826 Exp. Date 07/27

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 Νοεμβρίου 2026

08.30 - 09.15	Εγγραφές
09.15 - 09.30	Χαιρετισμοί – Προσφωνήσεις **κ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος** Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ **κ. Χριστίνα Κανακά-Gantenbein** Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Διευθύντρια Α' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ
09.30 - 12.30	**Συντονιστές: Γ. Νικολοπούλου - Α. Λουρίδα**
09.30 - 10.00	Νεότερες μέθοδοι διάγνωσης παιδιατρικών λοιμώξεων **Κ. Σπυριδοπούλου**
10.00 - 10.30	Φαρμακοκινητικά παράδοξα στην αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία **Γ. Ισμαήλος**
10.30 - 11.00	Λοιμώξεις από Hantavirus στο προσκήνιο. Να ανησυχούμε; **Θ. Γεωργακοπούλου**
11.00 - 11.30	Αποτελεσματικότητα μέτρων πρόληψης RSV: Κλινικά δεδομένα από την εφαρμογή τους **Τ. Σιαχανίδου**
11.30 - 12.00	Σύγχρονη επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων με την ανίχνευση βακτηριαιμιών από τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς **Γ. Σαρόγλου**
12.00 - 12.30	**Διάλειμμα**
12.30 - 14.15	**Συντονιστές: Γ. Σαρόγλου - Β. Συριοπούλου**
12.30 - 13.00	Η μικροβιακή αντοχή ως εθνικό πρόβλημα. Η έκταση του προβλήματος και οι επιπτώσεις στην καθημερινή πρακτική **Γ. Λ. Δαΐκος**

www.prevent-infections.gr

13.00 - 13.30 Επιδημιολογία και πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου: Νεότερα δεδομένα
Γ. Συρογιαννόπουλος

13.30 - 14.00 Εμβόλια για την αντιμετώπιση επιδημιών: Είναι εφικτή η έγκαιρη παρασκευή τους;
Ι. Παυλοπούλου

14.00 - 14.15 Συζήτηση

14.15 - 15.00 Μεσημεριανή διακοπή

15.00 - 17.00 Συντονιστές: Α. Μίχος - Θ. Πετροπούλου

15.00 - 15.30 Βακτηριακές λοιμώξεις δέρματος: Τοπικά αντισηπτικά, αντιμικροβιακές κρέμες ή συστηματική θεραπεία;
Δ. Γκέντζη

15.30 - 16.00 Κορτικοστεροειδή στην πνευμονία: Ναι, όχι, ίσως
Β. Σπούλου

16.00 - 16.30 Λοιμώξεις από *C. difficile* στην παιδιατρική: Πότε και πώς θεραπεύουμε
Δ. Μ. Κούκου

16.30 - 17.00 Εμβολιασμός για γρίπη στα παιδιά: Χρειάζεται και πως θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα
Χ. Ασημάκη

17.00 - 18.00 Συντονιστές: Α. Μίχος - Β. Σπούλου

Διάγνωση με μία ματιά
Ι. Παπαδάτου, Χ. Παπαφωτίου

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Τμήμα Λοιμώξεων, Α' Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ
Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
Τηλ. 210-746 7478 • **email:** idlab@med.uoa.gr

Ομιλητές-Συντονιστές

Ασημάκη Χαρά
Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ευρωκλινικής Παίδων

Γεωργακοπούλου Θεανώ
MD, MPH, PhD, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Γκέντζη Δέσποινα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Δαΐκος Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, ΕΚΠΑ

Ισμαήλος Γεώργιος
PharmD, PhD, Πειραματικό, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ELPEN (ETRCE)

Κούκου Δήμητρα-Μαρία
Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Λουρίδα Αθανασία
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, τ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ»

Μίχος Αθανάσιος
Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Νικολοπούλου Γεωργία
Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης HIV/AIDS, ΣΜΝ και Ηπατιτίδων, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Παπαδάτου Ιωάννα
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Παπαφωτίου Χρυσάνθη
Παιδίατρος, Εξειδικευόμενη στη Λοιμωξιολογία, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Παυλοπούλου Ιωάννα
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολόγος, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Πετροπούλου Θεώνη
MD, PhD, Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Παιδιατρικής Ανοσολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Σαρόγλου Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Προγράμματος Επιμελητείας Λοιμώξεων, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Σιαχανίδου Τάνια
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Σπούλου Βασιλική
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Σπυριδοπούλου Καλλιόπη
Ιατρός Βιοπαθολόγος MSc, PhD, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Συριοπούλου Βασιλική
Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ

Συρογιαννόπουλος Γεώργιος
Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Claripen®

κλαριθρομυκίνη

Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα



CLARIPEN GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLx60 ML
ΛΤ 4,93 €

CLA_SUS/DPM/JAD/06_2025/01

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ, σαρώνοντας τον κώδικα QR ή επικοινωνήστε με το τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης της εταιρείας.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη / πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Παπαδιαμαντοπούλου 41, 11528 Αθήνα, Τηλ: 2107756226
Εθνικής Αντιστάσεως 114, 55134 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310459920-1
www.elpen.gr

flyingcolours

Αυτό δεν το πρόλαβες!

Την εποχική γρίπη όμως, θα μπορούσες να την προλάβεις!

Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της λοίμωξης και των σοβαρών εκβάσεων που προκαλούνται από τους ιούς της γρίπης.[1]

Στην Ελλάδα συνιστάται ετήσιος εμβολιασμός παιδιών, έναντι της γρίπης[2]:
- Σε όλα τα βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών,
- Σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 5 ετών και άνω που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Συμβουλέψου τον Παιδίατρό σου

Μια πρωτοβουλία της AstraZeneca

Flu/4716739/1/0926

1. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Global Influenza Programme. https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/vaccines Accessed May 2026.
2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2026-Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις – Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) παιδιών και εφήβων – Υπουργείο Υγείας https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/emboliasmoi/ethniko-programma-emboliasmwn-epe-paidiwn-kai-efhbwn/14081-ethniko-programma-emboliasmwn-paidiwn-kai-efhbwn-2026-xronodiagramma-kai-systaseis Accessed Sept 2026

Prevenar 20®

Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο [20-δύναμο, προσροφημένο]



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Pfizer

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα,
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 00024290100
Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο,
Pfizer Ελλάς ΑΕ (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ : 22817690

PP-PNR-GRC-0112-MAY25

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Μεγάλοι Χορηγοί

ELPEN

Pfizer

Χορηγοί

AstraZeneca

MSD

Pharmex

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ACWY*



MenQuadfi®

Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου ορροομάδων A, C, W και Y



*MenACWY (Τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο ορροομάδων A,C,W,Y)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** MenQuadfi ενέσιμο διάλυμα. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου ορροομάδων A, C, W και Y. **Αντενδείξεις**: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Υπερευαισθησία: Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και η επίβλεψη θα πρέπει πάντα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ενός αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Συνοδό νόσημα: Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή: Συγκοπή (λιποθυμία) και άλλες καταστάσεις άγχους μπορεί να συμβούν μετά ή ακόμη και πριν από οποιονδήποτε εμβολιασμό ως μια ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή πτώσης ή τραυματισμού και για τη διαχείριση της συγκοπής. Θρομβοπενία και διαταραχές πηκτικότητας: Το MenQuadfi θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πηκτικότητας που θα αντενδείκνυται ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το πιθανό όφελος ξεπερνά σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Περίληψη του προφίλ ασφαλείας: Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό με μία εφάπαξ δόση MenQuadfi μόνο σε νήπια ηλικίας 12 έως 23 μηνών ήταν ευερεθιστότητα (36,7%) και ευαισθησία στη θέση ένεσης (30,6%) και σε ηλικίες 2 ετών και άνω ήταν ο πόνος στη θέση της ένεσης (38,7%) και μυαλγία (30,5%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες ή μέτριες σε ένταση. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από αναμνηστική δόση MenQuadfi σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν στους έφηβους και ενήλικες που έλαβαν πρωτογενή δόση MenQuadfi. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. Τοπικός Αντιπρόσωπος: BIANEΞ Α.Ε., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά Τηλ.: 210 8009111. **Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή. Λ.Τ.:** 70,85€

BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία,
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

SE24001MEN/1-1/2024